

PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM IODO-131

- Evitar substâncias que contenham iodo ou interfiram na função tireoidiana (alimentação; medicação cosmética, estudos contrastados) Orientar-se sobre lista completa de restrições durante o agendamento.
- Preparo intestinal na véspera da aquisição das imagens.
- Suspende hormônio tireoidiano por 3 a 4 semanas e dosar TSH, tireoglobulina e anticorpos anti tireoglobulina. Beta HCG obrigatório para mulheres em idade fértil (colhido 1 dia antes da dose de I-131)

Ou á critério do médico solicitante

- Usar TSH Recombinante (Thyrogen), com injeções no Dia1 e Dia2 (suspender hormônio tireoidiano a partir do Dia1 e retornar no dia da varredura), 5 mCi de I-131 vo no Dia3, imagens adquiridas no Dia5.
- Retornar com hormônio tireoidiano no dia da aquisição das imagens

Para mulheres em idade fértil, obrigatório teste de gravidez 24 h antes da administração.

Orientar o paciente sobre os cuidados de radioproteção por 7 dias após a ingestão do I-131 (evitar contato íntimo e prolongado com outras pessoas, notadamente crianças e gestantes, dormir em camas separadas, dar descarga em abundância após utilizar o vaso sanitário, separar e lavar separadamente e em água corrente os talheres)