

CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO-PERFUSÃO

Este exame é realizado para a avaliação funcional da perfusão das artérias coronárias com a análise comparativa da mesma durante o esforço e em situação de repouso.

O exame é realizado em duas etapas, uma de repouso outra de esforço, normalmente realizadas em dois diferentes dias diferentes.

Etapa de esforço:

Confirmar tipo de stress (definido pelo médico solicitante e/ou ergometrista):

- Físico: esteira ou bicicleta
- Híbrido: físico + farmacológico
- Farmacológico (Dipiridamol)

Preparo:

Em caso de Teste ergométrico: suspensão de medicação (a critério do médico solicitante), jejum de 2 a 3 horas, não fumar nas últimas 24 h.

Em caso de estresse com Dipiridamol:

- I- Suspender por 36 horas medicação para enxaqueca, medicamentos como aminofilina, Teofilina ou outras xantinas (encontrados normalmente em medicamentos para asma e bronquite)
- II- Suspender por 24 horas Dipiridamol;
- III- Suspender café, chá, refrigerantes, chocolates, cigarros e sucos cítricos por 24 horas e jejum de 03 horas.
- IV- Suspender qualquer medicação ou alimento contendo cafeína.